

I 第19週の発生動向 (2010/5/10~2010/5/16)

1. 感染性胃腸炎については、県全体の届出数は増加しています。特にむつ保健所管内では急増(前週の5.3人/定点から14.8人/定点)しています。
2. 水痘については、むつ保健所管内において**注意報**が発令されています。

II 第19週五類感染症定点把握 注:五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

青森県内の定点(医療機関)数については青森県感染症発生動向調査TOPページをご覧ください。

| 疾患名 | 東地方+青森市 | | 弘前 | | 八戸 | | 五所川原 | | 上十三 | | むつ | | 青森県計 | | 増減数 (前週からの増減) | 東地方(再掲) | | 青森市(再掲) | | |
|-----------|---------------|----------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------------------|---------|------|---------|------|------|
| | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | |
| 小児科 内科 | (85) | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | | | |
| 小児科 | (74) | | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | | | | | | | 6 | 0.1 | 2 | | | | | |
| (75) | 咽頭結膜熱 | | 1 | 0.1 | | | 2 | 0.4 | | | 7 | 1.8 | 10 | 0.2 | 0 | | | | | |
| (76) | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 17 | 1.9 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 9 | 2.3 | 40 | 1.0 | 16 | | 17 | 2.1 | |
| (77) | 感染性胃腸炎 | 97 | 10.8 | 25 | 2.8 | 15 | 1.7 | 22 | 4.4 | 20 | 3.3 | 59 | 14.8 | 238 | 5.7 | 77 | 16 | 16.0 | 81 | 10.1 |
| (78) | 水痘 | 3 | 0.3 | 9 | 1.0 | 6 | 0.7 | 3 | 0.6 | 8 | 1.3 | 21 | 5.3 | 50 | 1.2 | 23 | | | 3 | 0.4 |
| (79) | 手足口病 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | | | 1 | 0.2 | | | 5 | 0.1 | 4 | | | 1 | 0.1 |
| (80) | 伝染性紅斑 | 6 | 0.7 | | | 3 | 0.3 | | | 1 | 0.2 | 7 | 1.8 | 17 | 0.4 | 3 | | | 6 | 0.8 |
| (81) | 突発性発しん | 6 | 0.7 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 5 | 0.8 | 3 | 0.8 | 20 | 0.5 | 4 | | | 6 | 0.8 |
| (82) | 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| (83) | ヘルパンギーナ | | | 2 | 0.2 | | | | | | | | | 2 | 0.0 | 1 | | | | |
| (84) | 流行性耳下腺炎 | 6 | 0.7 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 4 | 0.8 | 6 | 1.0 | | | 20 | 0.5 | 5 | | | 6 | 0.8 |
| 眼科 | (86) | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| (87) | 流行性角結膜炎 | | | 2 | 0.7 | | | 5 | 5.0 | | | | | 7 | 0.6 | 2 | | | | |
| 基幹 | (92) | クラミジア肺炎 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| (93) | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| (95) | マイコプラズマ肺炎 | | | | | 6 | 6.0 | | | | | 3 | 3.0 | 9 | 1.5 | 7 | | | | |
| (96) | 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

は警報、は注意報。「空欄」:患者発生無し。

III 表II以外の感染症法対象疾患

(注:届出状況は速報値です)

- (9) 結核(二類全数把握疾患):弘前2人、青森市1人 (22年計:86人)
- (34) つつが虫病(四類全数把握疾患):五所川原1人 (22年計:1人)

IV 病原体検出情報

※()内は人数と検体採取日です。

・下北地域における急性胃腸炎患者4名の糞便から、**ノロウイルスGⅡ型**(3名、4/28)および**A群ロタウイルス(G血清型1)**(1名、5/7)が検出されました。

過去の全数把握疾患については、月報をご覧ください。

感染症の窓

つつが虫病

(四類全数把握)




図1 つつが虫病年次推移(青森県2007-2009年)




図2 年齢層別人数(2007-2009年累計:45人)

つつが虫病は、病原体である *Orientia tsutsugamushi* (リケッチア) を保有するダニに刺されることにより発症します。本県では、五所川原保健所管内の60歳代女性で今年初めての届出がありました。本疾患は、春~初夏及び秋期に増加する傾向にあることから注意が必要です(図1)。年齢別患者割合では、50歳以上の年齢層に多い傾向にあります(図2)。畑、山林、草地などから帰宅した後、5日~14日の間に、**発熱、刺し口、発疹**等の症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診してください。予防対策として長袖、長ズボン、手袋等を着用、肌が出る部分には防虫スプレーを噴霧し、地面に**直接寝転んだり**、腰を下ろしたりせず、作業中に脱いだ上着は草の上に放置しないなどの注意が必要です。