

難治性の肝炎のうち劇症肝炎 臨床調査個人票

(更新)

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ふりがな 氏名 | ----- | | 性別 | 1. 男 2. 女 | 生 年 月 日 | 1. 明治 2. 大正 3. 昭和 4. 平成 | 年 月 日 生 (満 歳) |
| 住 所 | 郵便番号 電話 () | | | 出 生 都 道 府 県 | 発病時在住 都 道 府 県 | | |
| 初診年月日 | 1. 昭和 2. 平成 年 月 日 | | | | 保 険 種 別 | 1. 協 2. 組 3. 船 4. 共 5. 国 6. 老 | |
| 身体障害者 手 帳 | 1. あり (等級____級) 2. なし | | 介 護 認 定 | 1. 要介護 (要介護度____) 2. 要支援 3. なし | | | |
| 生 活 状 況 | 社会活動 (1. 就労 2. 就学 3. 家事労働 4. 在宅療養 5. 入院 6. 入所 7. その他 (____)) 日常生活 (1. 正常 2. やや不自由であるが独力で可能 3. 制限があり部分介助 4. 全面介助) | | | | | | |
| 家 族 歴 | 1. あり 2. なし 3. 不明 ありの場合 (続柄) | | 受 診 状 況 (最近 6 か月) | 1. 主に入院 2. 入院と通院半々 3. 主に通院 (____/月) 4. 往診あり 5. 入通院なし 6. その他 () | | | |
| 発症と経過 (具体的に記述) | | | | | | | |
| 既往歴・生活歴 | | 初発症状 (平成 年 月 日) | | | 昏睡Ⅱ度以上出現時 (平成 年 月 日)の所見 | | |
| 肝炎患 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 発熱 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 発熱 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | B型キャリア | 1. あり 2. なし 3. 不明 |
| 肝以外の疾患 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 食欲不振 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 黄疸 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 輸血歴 | 1. あり 2. なし 3. 不明 |
| 薬物服用 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 全身倦怠 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 肝濁音界縮小 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 飲酒 | 1. 大酒家 2. 常習飲酒家 3. 機会飲酒 4. なし |
| | | 悪心・嘔吐 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 腹水 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | | |
| | | 黄疸 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 浮腫 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | | |
| | | 腹部膨満 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 頻脈 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | | |
| | | その他 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | 呼吸促拍 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | | |
| | | | | 羽ばたき振戦 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | | |
| | | | | 肝性口臭 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | | |
| | | | | 痙攣 | 1. あり 2. なし 3. 不明 | | |
| 画像所見 | | 肝組織検査 | | | | | |
| 肝萎縮 | 1. あり 2. なし 3. 不明 (1. 超音波 2. CT 3. その他 ()) | 1. 生検 2. 剖検 3. なし (所見:) | | | | | |
| 成 因 | | 肝炎ウイルスマーカー | | | 免疫マーカー | | |
| 1. ウイルス性 1. A型 2. B型 (1. 急性感染 2. キャリア 3. 不明) 3. C型 4. E型 5. その他 () | | I g M-HA 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | 抗核抗体 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | HBs抗原 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | 抗平滑筋 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | 抗LKM1 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | γグロブリン 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 |
| 2. 自己免疫性 | | HBc (200×) 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | 好酸球数 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | HBV-DNA 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | I g G 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | I g E 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | D-LST 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 |
| 3. 薬物性 () | | HCV抗体 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | | HCV-RNA 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | | | |
| 4. 成因不明 | | HEV-RNA 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | | I g M-HEV 1. 陽性 2. 陰性 3. 不明 | | | |
| 5. 評価不能 | | | | | | | |
| | 昏睡出現前 | 昏睡出現時 | 昏睡出現5日後 | 覚醒時 | 現在 | | |
| | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | | |
| 昏睡度 | | | | | | | |
| AST (IU/L) | | | | | | | |
| ALT (IU/L) | | | | | | | |
| 総ビリルビン (mg/dL) | | | | | | | |
| 直接ビリルビン (mg/dL) | | | | | | | |
| 直接/総ビリルビン比 | | | | | | | |
| プロトロンビン時間 (%) | | | | | | | |
| へパプラスチンテスト (%) | | | | | | | |
| ATIII (%) | | | | | | | |
| アルブミン (g/dL) | | | | | | | |
| アンモニア (μg/dL) | | | | | | | |
| AFP (ng/mL) | | | | | | | |
| HGF (ng/mL) | | | | | | | |
| 血小板数 (万/mm ³) | | | | | | | |
| 白血球数 (/mm ³) | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-------|---------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 合併症 | | | 鑑別除外診断 | | | |
| ①感染症 | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ①急性肝炎重症型 | 1. 除外できる 2. 除外できない | |
| ②消化管出血 | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ②遅発性肝不全 | 1. 除外できる 2. 除外できない | |
| ③腎不全 | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ③肝炎以外の急性肝不全 | 1. 除外できる 2. 除外できない | |
| ④DIC | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ④先行する慢性肝疾患 | 1. 除外できる 2. 除外できない | |
| ⑤心不全 | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | ⑤アルコール性肝炎 | 1. 除外できる 2. 除外できない | |
| ⑥脳浮腫 | 1. あり | 2. なし | 3. 不明 | | | |
| 治療法 | 使用薬剤等 | | | 治療効果 | | |
| | ステロイド | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| | グルカゴン・インスリン | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| | 特殊組成アミノ酸 | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| | 血漿交換 | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| | 血液濾過透析 | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| | プロスタグランジン | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| | インターフェロン | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| | ラミブジン | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| | サイクロスポリン | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| | 抗凝固療法 | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 |
| 肝移植 | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 | |
| その他 | 1. あり | 2. なし | 3. 今後予定 | 4. 不明 | 1. 著効 2. 効果あり 3. 不変 4. 悪化 5. その他 | |
| 医療上の問題点 | | | | | | |
| 医療機関名 | | | | | | |
| 医療機関所在地 | | | | | | |
| 電話番号 () | | | | | | |
| 医師の氏名 | | | | | | |
| 印 | | | | | | |
| 記載年月日：平成 年 月 日 | | | | | | |

肝性脳症の昏睡度分類（犬山分類：1972年）

| 昏睡度 | 精神症状 | 参考事項 |
|-----|---|---------------------------------|
| I | 睡眠・覚醒リズムの逆転。多幸気分、ときに抑うつ状態。だらしなく、気にとめない態度。 | retrospectiveにしか判定できない場合も多い |
| II | 指南力（とき・場所）障害、物を取り違える（confusion）。異常行動（例：お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど）。時に傾眠状態（普通の呼びかけで開眼し、会話ができる）。無礼な言動があったりするが、医師の指示には従う態度をみせる。 | 興奮状態がない 尿、便失禁がない 羽ばたき振戦あり |
| III | しばしば興奮状態、せん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。嗜眠状態（ほとんど眠っている。）外的刺激で開眼しうるが、医師の指示には従わない、又は従えない（簡単な命令には応じる）。 | 羽ばたき振戦あり 指南力障害は高度 |
| IV | 昏睡（完全な意識の消失）。痛み刺激に反応する | 刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめる |
| V | 深昏睡、痛み刺激に反応しない | |