

旅客の携行品よりアフリカ豚コレラウイルスの遺伝子が検出されました。 アフリカ豚コレラウイルスの侵入防止を徹底しましょう！


新千歳空港にて、中国からの旅客の携行品（豚肉ソーセージ）からアフリカ豚コレラウイルスの遺伝子が検出されました。豚飼養農家の皆様におかれましては、以下のことに留意し**病原体の侵入防止の徹底**をお願いします。

●防疫対策の再徹底●


- ☑飼育衛生管理基準の遵守の徹底
- ☑海外渡航自粛
- ☑消毒による人・車両を介した衛生管理区域へのウイルスの侵入防止対策
- ☑飼育豚の毎日の健康観察による異常豚の**早期発見・早期通報**

豚及びいのししに飼料を給与する際の注意点

食料の原料を把握しましょう（特に、食品残さ）
食品残さにより、アフリカ豚コレラや豚コレラに感染する可能性があるため、加熱不十分な肉を含む可能性を確認しましょう



加熱不十分な肉を含む可能性がある場合は、加熱処理（摂氏70度・30分以上又は摂氏80度・3分以上）することが求められています



既に加熱処理されている食品残さを飼料として給与する場合は、入手先へ確認等することにより、加熱不十分な肉が含まれていないことを確認しましょう

海外では、違法に持ち込まれた畜産物によってアフリカ豚コレラが発生した事例があることから、海外から不法に持ち込まれる畜産物が飼料として与えられることがないように注意しましょう



毎週月曜日には、家畜衛生対策の点検を行いましょ！

〒035-0072 むつ市金谷2丁目 18-25

電話 0175-22-1254

FAX 0175-22-1259

夜間及び休日の連絡先 090-5841-6810

下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所 むつ地区家畜衛生推進協議会

(別紙1)

平成30年10月22日
消費・安全局動物衛生課

中国からの旅客の携帯品における
アフリカ豚コレラ（ASF）遺伝子検査陽性例について


- 10月1日（月）到北京から新千歳空港に到着した旅客の携帯品から収去した豚肉ソーセージ（1.5kg。一定の加熱がされている模様。）について、18日（木）に動物検疫所においてASFの遺伝子検査（PCR）を実施したところ、ASFウイルスの遺伝子が確認。
- このため、19日（金）に実施したシーケンス（PCR増幅産物の遺伝子配列の解析）の結果、PCR産物の配列が現在までに中国、ポーランド、エストニア、ロシア及びジョージアで分離された株と100%一致し、これらの株と近縁であることが明らかとなった。
- 今後は農研機構 動物衛生研究部門において、感染力のあるウイルスが存在するかを確認するため、ウイルス分離を実施（結果は2～4週間後に出る見込み）。
- 農林水産省としては、本年8月3日に初めて、中国においてASFが確認されて以降、動物検疫を強化するとともに、注意喚起を行ってきており、今回の確認を受け、関係省庁に情報提供し、水際検疫の再強化を図っているところ。
- また、都道府県や養豚関係団体を通じて、生産者に対して情報を提供し、農場への侵入防止のため飼養衛生管理基準を遵守するよう改めて指導しているところ。

（検体写真）



予防対策の重要ポイント

【衛生管理区域】



①人・物・車両によるウイルスの持込み防止

- ・**衛生管理区域、豚舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底**
- ・衛生管理区域専用の衣服、靴の設置と使用の徹底
- ・人・物の出入りの記録
- ・飼料に肉を含み、又は含む可能性があるときは、あらかじめ**摂氏70度・30分以上又は摂氏80度・3分以上の加熱処理を徹底**

②野生動物対策

- ・飼料保管場所等へのねずみ等の野生動物の排せつ物等の混入防止
- ・豚舎周囲の清掃、整理・整頓
- ・**死亡家畜の処理までの間、野生動物に荒らされないよう適切に保管**

豚コレラ・アフリカ豚コレラの侵入防止対策を徹底しましょう!

本年9月、日本において26年振りに豚コレラが発生しました。近隣国では、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの発生が継続しており、侵入リスクが高い状況が続いています。

衛生管理を徹底しましょう!



関係者以外の農場への立入を禁止



農場に出入りする際には、消毒を実施



飼料に生肉を含む又は含む可能性がある場合は、十分に加熱処理

異状を発見したら直ちに通報しましょう!

豚コレラ

2018年9月
日本で発生

特徴的な症状が無く、気がつきにくい疾病です!

発熱、食欲不振、元気消失等、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等



うずくまり



豚胴の隅に集まるパイルアップ



目やに

写真出典: 国立研究開発法人農畜食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部

重症例は後肢麻痺・運動失調・四肢の激しい痙攣などの神経症状、皮下出血による紫斑(耳翼、尾、腹部、内股部)を呈し死亡。

アフリカ豚コレラ

2018年8月以降
中国で発生継続

病状は多岐に渡り、甚急性では突然死亡、急性では発熱が見られます。



死亡



チアノーゼ

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。甚急性では突然死亡、急性では発熱(40~42℃)、皮下出血、脾臓の腫大、粘血便、チアノーゼ等を呈し、死亡率は100%に近い。

写真出典: 国立研究開発法人農畜食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

詳細情報はこちら(農林水産省HP)

豚コレラについて:



アフリカ豚コレラについて:

