


令和7年 東青りんご情報 第3号

令和7年5月23日発行 東青農業普及振興室


生育ステージ（月/日）

地点	品種	年	発芽日	展葉日	開花日	満開日	落花日
青森市 浪岡 北中野	ふじ	本年	4/9	4/17	5/8	5/12	5/16
		平年	4/8	4/18	5/8	5/12	5/17
		前年	4/6	4/13	4/28	5/1	5/6
		平年比	1日遅	1日早	並	並	1日早
	つがる	本年	4/9	4/17	5/7	5/12	5/16
		平年	4/8	4/21	5/8	5/12	5/18
		前年	4/5	4/14	4/28	5/1	5/5
		平年比	1日遅	4日早	1日早	並	2日早
	王林	本年	4/6	4/13	5/4	5/9	5/14
		平年	4/6	4/16	5/5	5/10	5/14
		前年	4/3	4/9	4/26	4/29	5/3
		平年比	並	3日早	1日早	1日早	並
青森市 田茂木野	ふじ	本年	4/12	4/19	5/10	5/15	5/19
		平年	4/10	4/21	5/11	5/15	5/20
		前年	4/7	4/14	5/1	5/4	5/8
		平年比	2日遅	2日早	1日早	並	1日早
	つがる	本年	4/12	4/20	5/9	5/14	5/19
		平年	4/10	4/22	5/10	5/15	5/20
		前年	4/6	4/15	5/1	5/4	5/9
		平年比	2日遅	2日早	1日早	1日早	1日早
黒石市 りんご研	ふじ	本年	4/7	4/14	5/5	5/10	5/16
		平年	4/7	4/18	5/7	5/12	5/16
		前年	4/5	4/11	4/27	5/1	5/5
		平年比	並	4日早	2日早	2日早	並
	つがる	本年	4/4	4/14	5/3	5/10	5/16
		平年	4/6	4/19	5/7	5/12	5/17
		前年	4/3	4/12	4/27	5/1	5/6
		平年比	2日早	5日早	4日早	2日早	1日早
	王林	本年	4/3	4/11	5/2	5/7	5/14
		平年	4/6	4/16	5/5	5/11	5/15
		前年	4/1	4/9	4/25	4/29	5/4
		平年比	3日早	5日早	3日早	4日早	1日早


5月1日～22日気象（黒石アメダス） ＜平均気温（℃）＞



＜降水量（mm）＞



＜日照時間（時間）＞



※平年値：浪岡北中野のふじは平成13年～令和6年の平均値、つがるは平成17年～令和6年の平均値、
王林は平成18年～令和6年の平均値。
田茂木野のふじ・つがるは令和4年から調査場所変更のため参考値。
りんご研究所は2001～2020年の平均値。

【概況】

本年のふじの開花日は、浪岡北中野で5月8日、田茂木野で5月10日と平年並から1日早かった。
ふじの落花日は、浪岡北中野で5月16日、田茂木野で5月19日と平年より1日早かった。

1 作業の進ちょく状況

- ・ふじの落果直後の薬剤散布は、浪岡で5月14日頃から始まった。
- ・現在、摘果や草刈り等が行われている。

2 病害虫の発生状況

- ・腐らん病の発生がやや多い。

3 今後の作業

- ・「ふじの落花20日後頃」までは黒星病の重点防除時期なので、薬剤散布は10日間隔を遵守し、基準量を丁寧に散布する。なお、散布予定日に降雨が見込まれる場合は、事前散布する。
- ・高品質大玉生産に向け、果実形質を見極めながら一つなり摘果をできるだけ早く行う。
- ・ふじのつる割れの発生が多い園地では、ヒオモン水溶剤の利用を検討する（散布時期：満開20～30日後）。その場合、摘果剤は使用できないため注意すること。

自園地の状況に合わせて適期防除を実施しよう！
薬剤散布は基準量を丁寧に散布！
良果を見極め早めの摘果を！

モモシンクイガ等防除のために
コンフューザーRの設置をすみやかに！