




令和7年 東青りんご情報 第5号

令和7年7月2日発行
東青農業普及振興室

果実肥大

(横径: cm) 6月1日～6月30日気象 (黒石アメダス)

地点	品種	年	6/11	6/21	7/1
青森市 浪岡 北中野	ふじ	本年	2.5	3.3	4.2
		平年	2.4	3.3	4.0
		前年	3.5	4.1	5.0
		平年比	105%	101%	104%
	つがる	本年	3.1	3.8	4.8
		平年	2.8	3.8	4.6
		前年	3.6	4.3	5.3
		平年比	110%	101%	104%
	王林	本年	2.8	3.5	4.3
		平年	2.8	3.5	4.2
		前年	3.3	3.8	4.5
		平年比	103%	99%	102%
青森市 田茂木野	ふじ	本年	2.0	2.9	3.7
		平年	2.1	3.1	3.9
		前年	3.2	3.8	4.7
		平年比	95%	93%	96%
	つがる	本年	2.5	3.5	4.5
		平年	2.4	3.4	4.3
		前年	3.4	4.2	5.2
		平年比	102%	104%	105%
黒石市 りんご研	ふじ	本年	3.1	3.8	4.5
		平年	2.6	3.5	4.2
		前年	3.3	3.8	4.5
		平年比	119%	109%	107%
	つがる	本年	3.3	4.2	5.0
		平年	2.9	3.8	4.7
		前年	3.9	4.5	5.4
		平年比	114%	111%	106%



※平年値：浪岡北中野のふじは平成13年～令和6年の平均値、つがるは平成17年～令和6年の平均値、
王林は平成18年～令和6年の平均値。
田茂木野のふじ・つがるは令和4年から調査場所変更のため参考値。
りんご研究所は2001～2020年の平均値。

【概況】

ふじの7月1日における果実横径は、田茂木野、浪岡ともに平年を上回った。
6月1日～30日の平均気温は、平年比で青森は2.3℃、黒石は3.2℃高かった。
降水量は、平年比で青森は163%、黒石は84%であった。日照時間は、平年比で青森は117%、黒石は116%であった。

1 作業の進ちょく状況

- ・摘果、袋かけ、徒長枝整理、草刈り等が行われている。

2 病害虫の発生状況

- ・カメムシ類が多発している。
- ・黒星病の発生はほとんど見られていない。

3 今後の作業

- ・摘果を終えていない園地では、できるだけ早く適正な着果量に仕上げる。
- ・仕上げ摘果を終えた園地では、見落としがないか、必ず見直しをする。
- ・カメムシの卵塊は見つけ次第、捕殺・除去する。
- ・前年褐斑病の発生が多かった園地では、7月半ばの薬剤散布に「オンリーワンフロアブル」も使用し、散布予定日に降雨が予想される場合は、事前散布に徹する。

ふじの肥大量 (cm)

地点	年	6/21～7/1
青森市 浪岡 北中野	本年	0.9
	平年	0.7
	前年	0.9
青森市 田茂木野	本年	0.8
	平年	0.8
	前年	0.9
黒石市 りんご研	本年	0.7
	平年	0.7
	前年	0.7

◎こまめな休憩と水分補給で
熱中症を予防しよう！
◎青森県農業危害防止運動
展開中（6月～8月）